

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Thời gian thực hiện: tuần

Người tuyên truyền : đ/c Nguyệt , GVCN

HIV/AIDS được coi là một đại dịch nguy hiểm, là mối đe dọa đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của các quốc gia, các dân tộc trên toàn cầu. Nó tác động mạnh mẽ đến sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự và an toàn xã hội đe dọa sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đáng lo ngại hơn là HIV/AIDS đang lan tràn mạnh mẽ ở khắp các vùng miền từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo xa xôi của đất nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới.

Hiện nay vẫn chưa có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh HIV/AIDS. Vì vậy, biết cách tự phòng cho mình và cho cộng đồng cũng như tuyên truyền cho mọi người cùng hiểu biết được coi như là một vắc xin để phòng ngừa.

Vậy, HIV/ AIDS là gì ? Người mắc căn bệnh này có những triệu chứng nào? Các con đường lây nhiễm? và cách phòng tránh? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!

I.HIV/AIDS LÀ GÌ?

- **HIV** là một chữ viết tắt của loại virus gây suy giảm miễn dịch ở người (*Human Immunodeficiency Virus*).

- **AIDS** là chữ viết tắt của *hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người* . AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. Trong giai đoạn này ,hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy yếu nên người bệnh dễ mắc các bệnh như : nhiễm khuẩn, ung thư....

II. TRIỆU CHỨNG

Có 4 giai đoạn nhiễm HIV:

- 1. Giai đoạn sơ nhiễm** (còn gọi là thời kỳ cửa sổ): thời gian kéo dài từ 2 đến 6 tháng, cơ thể hoàn toàn bình thường .Xét nghiệm HIV cho kết quả âm tính (vì thế trong giai đoạn này dễ lây bệnh cho người khác nếu quan hệ tình dục không an toàn).
- 2. Giai đoạn nhiễm HIV không triệu chứng:** Thời gian từ 5 đến 7 năm, cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường. Xét nghiệm cho kết quả dương tính
- 3. Giai đoạn cận AIDS:** Vẫn không có biểu hiện đặc trưng ,xét nghiệm cho kết quả dương tính.
- 4. Giai đoạn AIDS:** có các triệu chứng sau:
 - Gầy sút, (giảm trên 10% trọng lượng cơ thể)

- Sốt, ỉa chảy, ho kéo dài trên một tháng
- Xuất hiện nhiều bệnh như: ung thư ,viêm phổi, lao ,viêm da, lở loét toàn thân

III. CÁC CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM HIV

Có 3 con đường lây truyền HIV:

1. Tình dục

Virus HIV có rất nhiều trong chất dịch sinh dục của người bị nhiễm .Do vậy, virus HIV có thể xâm nhập vào máu bạn tình qua cơ quan sinh dục. Việc sinh hoạt tình dục rồi có giao hợp hay chỉ tiếp xúc cơ quan sinh dục đều có khả năng lây nhiễm.

2. Đường máu

HIV có rất nhiều trong máu người nhiễm. Do vậy việc dùng chung bơm kim tiêm, dụng cụ y tế không qua tiệt trùng với người nhiễm HIV, truyền máu của người nhiễm HIV đều làm cho bạn bị lây nhiễm HIV

Riêng về ma túy, bản thân nó không sinh ra HIV nhưng người nghiện ma túy dễ dàng bị lây nhiễm HIV khi dùng chung bơm kim tiêm với bạn nghiện hoặc bơm kim tiêm tại tụ điểm bán thuốc.

3. Từ mẹ sang con

Tỷ lệ trẻ em sinh ra bị nhiễm HIV từ những người mẹ bị nhiễm HIV từ 25 - 30% . HIV có thể lây từ mẹ sang bé qua nhau thai khi bé trong bụng mẹ, qua máu và chất dịch của mẹ khi sinh hoặc qua sữa mẹ khi mẹ cho con bú. Trẻ sơ sinh nhiễm HIV thường không sống được quá 3 năm.

IV. CÁCH PHÒNG,TRÁNH:

Dựa vào Đường lây nhiễm HIV, có các biện pháp phòng sau:

1. Phòng nhiễm HIV/AIDS lây qua đường tình dục :

- Sống lành mạnh ,chung thủy một vợ một chồng và cả hai người đều chưa bị nhiễm HIV. Không quan hệ tình dục bừa bãi
- Trong trường hợp quan hệ tình dục với một đối tượng chưa rõ có bị nhiễm HIV không, cần phải thực hiện tình dục an toàn để bảo vệ cho bản thân bằng cách sử dụng bao cao su đúng cách.
- Phát hiện sớm và chữa kịp thời các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS vì những tổn thương do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục sẽ là cửa vào lý tưởng cho HIV.

2. Phòng nhiễm HIV/AIDS qua đường máu

- Không tiêm chích ma túy .
- Chỉ truyền máu và các chế phẩm máu khi thật cần thiết và chỉ nhận máu và các

chế phẩm máu đã xét nghiệm HIV.

- Chỉ sử dụng bơm kim tiêm vô trùng. Không dùng chung bơm kim tiêm. Sử dụng dụng cụ đã tiệt trùng khi phẫu thuật, xăm, xỏ lỗ, châm cứu...
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với các dịch cơ thể của người nhiễm HIV.
- Dùng riêng đồ dùng cá nhân: dao cạo, bàn chải răng, bấm móng tay...

3. Phòng nhiễm HIV/AIDS lây truyền từ mẹ sang con:

- Người phụ nữ bị nhiễm HIV thì không nên có thai vì tỷ lệ lây truyền HIV sang con là 30%, nếu đã có thai thì không nên sinh con .
- Trường hợp muốn sinh con, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn về cách phòng lây nhiễm HIV cho con .
- Sau khi đẻ có điều kiện thì nên cho trẻ dùng sữa bò thay thế sữa mẹ mẹ.

Tác giả

Nguyễn Thị Nguyệt