

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 4996 /SGDĐT-CTTT  
V/v phối hợp triển khai chiến dịch tiêm  
bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ  
tại các trường mầm non, mẫu giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thị xã;
- Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND Thành phố về triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 - 5 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu:

1. Các trường mầm non, mẫu giáo:

- Phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh về lợi ích, ý nghĩa của chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi - Rubella; vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân và gia đình trong việc tiêm chủng phòng bệnh truyền nhiễm;
- Lập danh sách toàn bộ trẻ từ 1-5 tuổi theo từng lớp (*theo mẫu của cơ quan y tế*) gửi trạm y tế xã, phường;
- Phối hợp rà soát tiền sử tiêm chủng (*những trẻ đã tiêm 1 mũi vắc xin Sởi - Rubella/ Sởi - Quai bị - Rubella trong vòng 1 tháng cần photo giấy tiêm chủng gửi nhà trường*); rà soát các đối tượng tạm hoãn trong thời gian triển khai tiêm tại trường, gửi thông báo để gia đình đưa trẻ đến Trạm Y tế nơi cư trú tiêm bổ sung đầy đủ;
- Thông báo bằng văn bản (*do cơ quan y tế cung cấp*) về việc tiêm bổ sung vắc xin phòng Sởi - Rubella tại trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, đề nghị gia đình cho trẻ ăn no trước khi đến trường trong ngày tiêm chủng (*với những trường không tổ chức cho trẻ ăn bữa sáng*);
- Thông nhất với trạm y tế xã, phường về thời gian tổ chức tiêm đảm bảo đạt chỉ tiêu trên 95% trẻ được tiêm, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc dạy, học và các hoạt động khác của nhà trường;
- Bố trí điểm tiêm chủng theo qui định chuyên môn của ngành Y tế, khu vực phòng chờ nên bố trí cách biệt tránh không để trẻ trực tiếp nhìn thấy tiêm (*nên có tranh ảnh, trò chơi hoặc các video clip có các nội dung giải trí hấp dẫn*) tạo môi trường thân thiện giảm tâm lý lo sợ, căng thẳng;
- Bố trí nhân lực phối hợp với cơ quan Y tế tổ chức tiêm chủng. Chỉ đạo các thầy cô giáo động viên để trẻ yên tâm, tránh sợ hãi quá mức;
- Thông báo kịp thời với Trạm Y tế và phòng GDĐT về các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng khi trẻ đang học tập tại trường. Phối hợp giải quyết các

vấn đề sức khỏe học sinh sau tiêm chủng, hướng dẫn phụ huynh số điện thoại tư vấn sau tiêm chủng;

- Nhà trường nhận lại toàn bộ phiếu xác nhận tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella của trẻ và có trách nhiệm gửi lại phiếu này đến phụ huynh;

- Phối hợp với Trạm y tế xã phường tổng hợp kết quả học sinh được tiêm chủng tại trường báo cáo phòng GDĐT; các trường mầm non trực thuộc Sở báo cáo Sở GDĐT.


## 2. Các phòng GDĐT quận huyện thị xã:

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo triển khai thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 - 5 tuổi theo Kế hoạch;

- Phối hợp kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella tại các nhà trường. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT sau khi kết thúc chiến dịch qua Email: [hssv@hanoiedu.vn](mailto:hssv@hanoiedu.vn); báo cáo ngay khi có trường hợp bất thường về sức khỏe học sinh liên quan đến tiêm chủng tại trường qua số điện thoại: 024. 9411232./ly

### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Thành phố (Để báo cáo);
- Sở Y tế (Để phối hợp);
- Đ/c Giám đốc (Để báo cáo);
- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiên;
- Phòng GDMN (Để phối hợp);
- Lưu VT, CTTT.



Phạm Xuân Tiên

## BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH SỎI, CÁCH PHÒNG CHỐNG VÀ CHIẾN DỊCH TIÊM BỎ SUNG VÂN XIN PHÒNG BỆNH SỎI - RUBELLA

(Thu phát thanh tại các xã phường, các điểm tiêm)

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây ra. Sởi là nguyên nhân quan trọng gây tử vong ở trẻ em trên toàn cầu mặc dù đã có vắc xin phòng bệnh an toàn và hiệu quả. Bệnh rất dễ lây và có khả năng gây dịch lớn.

Bệnh lây qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp hoặc qua các đồ vật mới bị nhiễm các dịch tiết từ đường hô hấp của người mắc bệnh. Bệnh có biểu hiện đặc trưng là sốt, viêm long đường hô hấp, viêm kết mạc và phát ban; có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu chảy....

Mọi đối tượng chưa tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ đều có nguy cơ mắc bệnh.

Để chủ động phòng chống bệnh sởi ngành Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

1. Hãy đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi ngay khi trẻ đủ 9 tháng tuổi và tiêm nhắc lại mũi 2 vắc xin phổi hợp sởi – rubella khi trẻ đủ 18 – 23 tháng tuổi trong Tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chiến dịch do cơ quan y tế địa phương tổ chức.

2. Người lớn trong gia đình có trẻ dưới 5 tuổi chưa mắc bệnh sởi hoặc chưa tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh sởi và phụ nữ trước khi mang thai tối thiểu 3 tháng cần chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh sởi (có thể tiêm vắc xin phổi hợp phòng bệnh sởi – quai bị - rubella) tại các cơ sở tiêm chủng để phòng bệnh cho chính bản thân và cho trẻ trong gia đình mình.

3. Thường xuyên vệ sinh các nhân, vệ sinh mũi, họng, mắt hàng ngày cho trẻ. Với người lớn trước khi tiếp xúc với trẻ cần vệ sinh bàn tay, thay quần áo...

4. Ăn uống đầy đủ chất, dinh dưỡng hợp lý.

5. Nơi ở phải được thông thoáng, lưu thông không khí như: mở cửa sổ thường xuyên, có ánh nắng mặt trời chiếu vào, bật quạt để thông thoáng khí...

6. Không cho trẻ em dùng chung vật dụng cá nhân (khăn mặt, bàn chải, cốc, chén, bát, đũa..), đồ chơi hoặc đồ vật dễ bị ô nhiễm chất tiết mũi họng của người mắc bệnh. Làm sạch vật dụng cá nhân, đồ chơi, đồ vật nghi bị ô nhiễm chất tiết mũi họng của người mắc bệnh bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường với nước sạch.

7. Lau sàn nhà, nấm đẩm cửa, mặt bàn, ghế, khu vệ sinh chung hoặc bề mặt của đồ vật nghi ngờ bị ô nhiễm dịch tiết mũi họng của bệnh nhân bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường từ 1 – 2 lần/ngày.

8. Hạn chế tiếp xúc với các trường hợp mắc/nghi mắc bệnh, khi phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế và các trang bị phòng hộ cá nhân. Phụ nữ có thai tuyệt đối không tiếp xúc với người mắc bệnh sởi.

9. Khi phát hiện trường hợp có triệu chứng như sốt, phát ban, chảy nước mũi,... gia đình phải thông báo ngay đến Trạm y tế xã, phường; các cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí, điều trị, cách ly kịp thời.

10. “Tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng chống bệnh sởi !”

“Hãy đưa trẻ từ 1- 5 tuổi đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi-rubella tại các trường mầm non, mẫu giáo hoặc tại trạm y tế”